



fin
plagas

RATICIDA CEBO FRESCO

20601
20602



FICHA TECNICA

INTRODUCCIÓN

RATICIDA CEBO FRESCO FLOWER es un es un producto a base de Bromadiolona presentado en forma de pasta fresca.

El preparado está listo para su empleo como cebo, con cebo pasta fresca que incorpora diversos atrayentes que lo hacen aún más apetecible para los roedores. Es activo contra roedores resistentes a la Warfarina.

COMPOSICIÓN

Bromadiolona 0,0029 % p/p

Producto biocida (PT14)
Nº Inscripción en el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública: ES/APP (NA)-2018-14-00151

PRESENTACIÓN

Cebo fresco de 10g aprox.

Se presenta en:
Caja con 150g
Caja de 2 x 150 g

PRINCIPALES APLICACIONES

* AUTORIZADO USO DOMÉSTICO *

La principal aplicación del **RATICIDA CEBO FRESCO FLOWER**, es para el control de ratas, ratones y demás roedores. PARA USO POR EL PUBLICO EN GENERAL.



RATA GRIS



RATÓN DE CAMPO

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

APLICACIONES AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO Y DOSIS.

- Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. Los portacebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de

roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras,...). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras.

- No abrir la bolsita que contiene el cebo. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros o mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. No colocar los portacebos cerca de sistemas de drenaje de agua donde el cebo pueda entrar en contacto con el agua. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Para uso en interior: cebo en pasta listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.

Ratones: 60 gramos de cebo por portacebo.

Ratas: 100 gramos de cebo por portacebo.

Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5-10 metros (5 metros en el caso de una infestación muy fuerte y 10 metros en una infestación débil). Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.

Recargar el portacebos cuando sea necesario. Se recomienda el uso de guantes.

Para uso alrededor de edificaciones: Ratas: 100 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar mas de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5-10 metros (5 metros en el caso de una infestación muy fuerte y 10 metros en una infestación débil). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Los portacebos deben revisarse a los 5-7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario. Se recomienda el uso de guantes.

Medidas de mitigación del riesgo: aplicar medidas de control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta del cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores. El producto se usará en portacebos resistentes a la manipulación. El uso de este producto debería eliminar los roedores en un plazo de 35 días. Buscar y retirar los roedores muertos durante el tratamiento, como

mínimo siempre que se revisen los portacebos. Eliminar los roedores muertos como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

Debido al modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser efectivos tras el consumo del cebo.

Caducidad: La Bromadiolona mantiene su efectividad raticida al menos durante cinco años. Sin embargo, el grano que actúa de soporte puede resultar menos apetecible a los roedores a partir de los dos años de fabricación.

Precauciones. Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre u orina. Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario. En caso de: - Exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón. – Exposición ocular: compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos. - Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provoque el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase Y. consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA TELÉFONO: 91 512 04 20. Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota. Peligroso para la fauna salvaje.

Para uso por el público en general: Se recomienda el uso de guantes. Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Llevar guantes de protección. Consultar a un médico en caso de malestar. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja. Los roedores son transmisores de enfermedades: No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación. Este producto contiene un agente amargante y un colorante.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.