



Producto: COMPO Abono Rosales y Trepadoras

Ventajas del producto

Abono de liberación lenta durante 5 meses, específico para rosales y arbustos florales (forsythia, lila, jazmín blanco, etc...) y plantas trepadoras. Abonar sólo una vez por temporada.

Los nuevos abonos de liberación lenta COMPO BIO con lana de oveja son una verdadera innovación. Son 100 % orgánicos. Así estos abonos naturales tienen un efecto inmediato y a largo plazo, consiguiendo una duración de 5 meses.

Con una sola aplicación, sus plantas estarán nutridas para toda la temporada. Además, los abonos de liberación lenta COMPO BIO se caracterizan por su gran capacidad de almacenamiento de agua. Los gránulos de abono pueden absorber bien el agua gracias a la lana de oveja que contienen. Sus plantas estarán mejor hidratadas durante los periodos secos.

Características Técnicas

Tipo de Producto: ABONO ORGÁNICO NPK 6+3+5

Composición:

6 % Nitrógeno (N) total:
5,6 % Nitrógeno (N) orgánico
0,4 % Nitrógeno (N) amoniacal.
3 % Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total.
5 % Óxido de potasio (K₂O) total.
36 % Carbono (C) orgánico.
Pobre en cloruro

Materias primas de origen orgánico: 50 % Lana de oveja, harina de pelo, harina de huesos, melaza (patata), vinaza de remolacha azucarera, subproductos vegetales de la industria alimentaria (cáscaras de cacao...).

Tamaños de envase: Estuche de 750 gr



Producto: COMPO Abono Rosales y Trepadoras

Aplicación

Ámbito / Cantidad:

Trabaje el abono bien en el suelo (3-4 cm de profundidad).

- Para las nuevas plantaciones, puede añadir el abono directamente en el hoyo de plantación.
- Cada aplicación de abono debe ir acompañada de un riego suficiente.
- Se recomienda usar guantes de trabajo durante la aplicación y lavarse las manos después de la misma.

Dosificaciones: gr./m²:

| Dosis Cultivo / Dosagem Cultura | Plantación / Plantação: (g/m ²) | Abonado / Adubação plantas existentes: (g/m ²) |
|--------------------------------------|---|--|
| Rosas / Roseiras | 70 | 150 - 170 |
| Arbustos florales / Arbustos florais | 60 | 100 - 150 |
| Plantas trepadoras / Trepadeiras | 40 | 100 |

Instrucciones de dosificación:

1 cucharada sobera colmada = aprox. 15 g

1 puñado = aprox. 40 g

Período de utilización:

| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| Ideal | Posible | No Aconsejable |
|-------|---------|----------------|
| | | |