



FOSFITEC

FUNGICIDA SISTÉMICO

60296

Nº Registro: ES-00302

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

FOSFITEC FUNGICIDA SISTEMICO es un fungicida sistémico especialmente formulado para el **control de *Phytophthora* y *mildius***. Presenta una acción directa sobre los hongos patógenos impidiendo la formación de esporas reproductoras y, por otra parte, estimula la producción de sustancias de defensas naturales de la planta (fitoalexinas).

Penetra en el interior de las hojas por lo que se muestra muy resistente al lavado por la lluvia. Su especial formulación permite una gran uniformidad y adherencia sobre la vegetación tratada.

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica

COMPOSICIÓN

Fosfonato Potásico (expresado como ácido fosforoso) 51% p/v
Equivalente a 790 g/L de mezcla de fosfonatos potásicos.

PRESENTACIÓN

Concentrado Soluble (SL)

Se presenta en:
Botella de 100 cc

PRINCIPALES APLICACIONES

FOSFITEC FUNGICIDA SISTEMICO es un fungicida de contacto y sistémico con actividad preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta. Actúa de forma eficaz contra muchas enfermedades como: **Phytophthora, Repilo y Mildius**.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Aplicar al aire libre mediante pulverización manual con mochila.

AGUACATE contra *Phytophthora cinnamoni*.

- Aplicar a una dosis aprox de 1-2 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días.
- Aplicar al aire libre durante BBCH 59-67, 71-75, 75-85

ARBUSTOS FRUTALES contra *Phytophthora* spp.

- Aplicar a una dosis aprox de 2-4 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 15 días.
- Indicado para mirtilo, grosellero, zarzamora y frambueso (usos menores por jerarquía)
- Aplicar al aire libre durante BBCH 33-69.

CAQUI contra *Alternaria alternata*

- Aplicar a una dosis aprox de 2-4 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 15 días.
- Aplicar al aire libre durante BBCH 76-89.

HIERBAS AROMÁTICAS Y FLORES COMESTIBLES contra *Bremia lactuce*

- Aplicar a una dosis aprox de 2-4 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días.
- Indicado para perifollo, cebollino, perejil, salvia, romero, tomillo, albahaca y estragón (usos menores por jerarquía)
- Aplicar al aire libre durante BBCH 12-49.

LECHUGA Y SIMILARES contra *Bremia lactucae*

- Aplicar a una dosis aprox de 2-4 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días.
- Incluye canónigo, escarola, mastuerzo, barbarea, rúcula, mostaza china y brotes tiernos incluidas Brassicas (usos menores por jerarquía)
- Aplicar al aire libre durante BBCH 12-49.

OLIVO contra Repilo (*Venturia oleaginea*).

- Aplicar a una dosis aprox de 2-3 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días.
- Aplicar al aire libre durante BBCH 11-81

PATATA contra *Phytophthora infestans*.

- Aplicar a una dosis máxima de 2-4 ml/litro de agua
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días.
- Aplicar al aire libre durante BBCH 12-49.

CONDICIONES GENERALES DE USO

- Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización foliar manual.
- Para cultivos rotacionales, se recomienda un intervalo mínimo de 30 días previo a la plantación del cultivo siguiente.
- Consulte al procesador antes de usar en cultivos para procesamiento.


PRECAUCIONES

- No se recomienda mezclar con aceites ni aplicar sobre cultivos en los que se han aplicado formulados a base de aceites, porque evitaría la penetración del producto en la planta.
- No se conocen otras incompatibilidades con el producto, pero en cualquier caso antes de realizar una mezcla se recomienda realizar una prueba o consultar con el servicio técnico de la empresa.

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección debe transcurrir un mínimo de:

- 7 días en arbustos frutales.
- 15 días en aguacate, hierbas aromáticas y flores comestibles, lechuga y similares, olivo, patata.
- 20 días en caqui.



OBSERVACIONES

FOSFITEC FUNGICIDA SISTEMICO es un **PRODUCTO FITOSANITARIO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONA Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.