



# FYTOSAVE FITOVACUNA VEGETAL



## FICHA TECNICA

70603 - 70604

### INTRODUCCIÓN

**FYTOSAVE** es un nuevo potenciador con efecto vacuna que activa y estimula la inmunidad innata de las plantas frente a enfermedades tipo Oídio.

- Primera Vacuna Vegetal (FITOVACUNA) registrada en España
- Primer producto considerado como de Bajo Riesgo registrado en España

### COMPOSICIÓN

**COS-OGA 1,25% p/v**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº ES-00209

**Apto para Agricultura Ecológica (Certificado CAEE)**

### PRESENTACIÓN

**Concentrado soluble (SL)**

**Se presenta en:**  
70603 - Estuche con botellín de 100ml  
70604 – Botella LpD

### PRINCIPALES APLICACIONES

#### \* AUTORIZADO PARA JARDINERIA EXTERIOR DOMESTICA \*

La principal aplicación del **FYTOSAVE**, es contra el oídio de las plantas.

Activa las defensas de la planta frente al Oído de forma que es la propia planta la que se defiende de la enfermedad: sin riesgo de que se generen resistencias.

Sin plazo de espera entre el tratamiento y la recolección para las hortícolas: se puede recolectar el mismo día del tratamiento



Oídio

### MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

#### APLICACIONES AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO Y DOSIS.

- Aplicar en pulverización foliar comenzando las aplicaciones cuando se prevea la aparición de la enfermedad.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	VOLUMEN DE CALDO	PERIODICIDAD	PLAZO DE SEGURIDAD*
Berenjena Pimiento Tomate	Oídio	75 mL / 15 L de agua	75 – 100 mL/ 1m <sup>2</sup>	Aplicar desde que aparece la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa. Número máximo de tratamientos 5 durante el ciclo del cultivo separados cada 7 días	No procede

Calabacín Calabaza Melón Pepino	Oídio	75 mL / 15 L de agua	50 mL/ 1m <sup>2</sup>	Aplicar desde que aparece la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta que el tercer fruto sobre el tallo principal ha alcanzado el tamaño y la forma típica. Número máximo de tratamientos 5 durante el ciclo del cultivo separados cada 7 días	No procede
Vid	Oídio Mildiu	75 mL / 15 L de agua	40 – 100 mL/ 1m <sup>2</sup>	Realizar la 1ª aplicación antes de la aparición de la enfermedad desde 3 hojas, desplegadas. Número máximo de tratamientos 8 durante el ciclo del cultivo separados cada 8 – 10 días	3 días

\* **PLAZO DE SEGURIDAD:** Corresponde al tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento y la recolección de plantas y frutos comestibles y/o entrada de ganado

Precauciones:

**Almacenamiento:** conservar el producto en su envase original. Conservar en un lugar fresco protegido de la humedad y del frío.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.