

Gebrauchsanweisung



Balsamol Blattdünger

250 ml

- zur Düngung und sofortigen Kräftigung von Immergrünen und anderen Pflanzen
- aus natürlichen Rohstoffen
- natürlicher Grüneffekt

Organischer Blattdünger mit vitalisierender Wirkung

- zur Kräftigung und Wiederbelebung von Immergrünen, Koniferen und Zierpflanzen, die durch Umweltbelastungen, Frost, Trockenheit, Umpflanzung oder schlechte Standortbedingungen geschädigt sind
- bewirkt deutliche Qualitäts- und Ertragssteigerungen bei Erdbeeren, Reben, Obstbäumen, Himbeeren, Tomaten, Rosen, Kohl, Kartoffeln, Salat und anderen Kulturen
- enthält als Wirkstoffe natürliche Aminosäuren und Peptide



Artikelnummer 00858

GTIN Basisartikel 4005240008584

Wirkstoff/Deklaration **Organischer N-Dünger 9, flüssig hergestellt unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten**

- 9,0 % Gesamtstickstoff (N)

Ausgangsstoffe: Tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 3 nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: hydrolysierte Proteine)

Nebenbestandteile:

- 0,8 % Natrium (Na)
- 50,0 % organische Substanz, chloridarm



| | |
|-------------------------------------|---|
| Anwendung | <p>Balsamol Blattdünger führt den Pflanzen direkt über die Blätter bzw. Nadeln natürliche Aminosäuren zu. Der darin gebundene Stickstoff wird so sehr schnell aufgenommen. Die Revitalisierung der Pflanzen setzt sofort ein.</p> <p>Immergrüne und Koniferen: Balsamol Blattdünger mehrmals 0,3-1 %ig, d.h. 15-50 ml auf 5 Liter Wasser, spritzen. Kann ganzjährig gespritzt oder auch gegossen werden. Besonders bewährt hat sich die Anwendung im Frühjahr (März-Mai) an den ersten warmen Tagen bei Vegetationsbeginn. Bei stark geschädigten Bäumen weitere Behandlungen im Abstand von ca. 6-8 Wochen vornehmen. Je nach Zustand der Pflanzen 0,3-1 %ig spritzen, d.h. 15-50 ml Balsamol Blattdünger in 5 Liter Wasser.</p> <p>Gemüse und Salat: Ca. 1 Woche nach der Pflanzung, 0,2 %ig und ca. 3 Wochen nach der Pflanzung 0,3 %ig spritzen.</p> <p>Erdbeeren: 10-14 Tage nach der Pflanzung im Spätsommer, 0,5 %ig spritzen. Weiterhin ca. 1 Woche vor der Blüte 0,3 %ig, bei Blühbeginn 0,5-1 %ig und bei Vollblüte 0,5 %ig spritzen.</p> <p>Kern-, Stein- und Beerenobst: Bei Vegetationsbeginn 0,3 %ig spritzen. Weiterhin ca. 1 Woche vor der Blüte 0,5 %ig, während der Blüte 0,3 %ig und nach der Ernte 0,5 %ig spritzen.</p> <p>Zierpflanzen: Von März-Mai mit einer 0,3 %igen Lösung spritzen. Eventuell 1-2 mal wiederholen.</p> |
| Weitere Anwendungshinweise | <p>Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor. Grünflächen, Zierrasen, Sportrasen etc. nach der Aufbringung wässern und auf sonstigen Flächen einarbeiten. Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden</p> |
| Anwendungszeitraum | <p>Februar-Oktober</p> |
| Mischbarkeit | <p>Balsamol Blattdünger ist mischbar mit Algan Wachstumshilfe, Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei, Neem Plus Schädlingsfrei, Neudo-Vital Rosen-Spritzmittel, Neudosan Neu Blattlausfrei, Neudosan Obst- & GemüseSchädlingsfrei, Xentari Raupenfrei, Spruzit Schädlingsfrei, Neudorff BioKraft Vitalkur für Rosen und Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei.</p> <p>Balsamol Blattdünger ist nicht mischbar mit Promanal Neu Schild- und Wolllausfrei.</p> |
| Wirkungsdauer der Nährstoffe | <p>ca. 3 Wochen</p> |
| Lagerung | <p>Für Kinder und Haustiere unerreichbar lagern. Keine Mischung mit Futtermitteln.</p> |